

ხორბლის და თავთავიანი მარცვლეული კულტურებისთვის

დაავადებების და მავნებლების გავრცელების პრევენცია

#/#	განვითაების სტადია	მავნე ობიექტი	შესაწამლი ხსნარი		
			ელექსირი	პრეპარა	წყალი,
1	თესლის დამუშავება	მტვრიანა, მაგარი და ჯუჯა გულდაფშუტები, ჰელმინთოსპორიოზული და ფუნარიოზული ფესვის სიდამპლევები, თესლის ობი, სეპტორიოზი; პურის ბზუალა, მავთულა ჭია, ცხვირგრძელები	სიმინდის და თავთავიანი მარცვლეული კულტურებისთვის	5	600
2	აღმოცენების შემდეგ, 1-3 ფოთლის ფაზა	გულდაფშუტა, ღეროს ჟანგები, სეპტორიოზი, ნაცარი, ჰელმინტოსპორიოზი, მავნე კუსებურა, თრიფსები, ჭიჭინობელები, ხოჭოები, რწყილები, ჭია-წურბელა, პურის ხერხიები, ბუგრები		5	600
3	ბარტყობის დასაწყისი	გულდაფშუტა, ღეროს ჟანგები, სეპტორიოზი, ნაცარი, ჰელმინტოსპორიოზი, მავნე კუსებურა, თრიფსები, ჭიჭინობელები, ხოჭოები, რწყილები, ჭია-წურბელა, პურის ხერხიები, ბუგრები		5	600
4	ბარტყობა	გულდაფშუტა, ღეროს ჟანგები, სეპტორიოზი, ნაცარი, ჰელმინტოსპორიოზი, მავნე კუსებურა, თრიფსები, ჭიჭინობელები, ხოჭოები, რწყილები, ჭია-წურბელა, პურის ხერხიები, ბუგრები		5	600
5	აღერება	გულდაფშუტა, ღეროს ჟანგები, სეპტორიოზი, ნაცარი, ჰელმინტოსპორიოზი, მავნე კუსებურა, თრიფსები, ჭიჭინობელები, ხოჭოები, რწყილები, ჭია-წურბელა, პურის ხერხიები, ბუგრები		5	600
6	*დამუხლება	-		-	-
7	*დათავთავება	-		-	-
8	*ყვავილობა	-		-	-
9	რძისებურ-ცვილისებური სიმწიფე	ღეროს ჟანგები, სეპტორიოზი, ნაცარი, ჰელმინტოსპორიოზი,		10	600

* ამ ფაზებში როგორც წესი დამუშავებას არ ითხოვს